

検査ニュース

No.138

ご挨拶

平素より、佐賀県医師会成人病予防センター業務には、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
今回は「検査一時受託休止」についてご案内申し上げます。

佐賀県医師会成人病予防センター
担当理事 志田 正典

● 検査受託〔一時休止〕 (平成 25 年 2 月 20 日 (水) ご依頼分をもって)

「血清 NTx (骨粗鬆症)」検査につきまして、当面、測定試薬の供給が停止されるため急遽ではございますが、検査受託を一時休止させていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
なお、尿中 NTx (骨粗鬆症) につきましては、通常どおり受託可能です。

案内書掲載頁	項目コード No.	検査項目	備考
45	2404	血清 NTx (骨粗鬆症)	検査試薬供給一時停止のため

▼ 【参考資料】骨代謝マーカーの種類

	骨吸収マーカー	骨形成マーカー
コラーゲン代謝	I 型コラーゲン架橋 N-テロペプチド (NTx) (骨粗鬆症)	インタクト I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド (Intact P I NP)
酵素活性	骨型酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ (TRACP-5b)	骨型アルカリホスファターゼ (BAP)

検査項目のご紹介 「TRACP-5b」

- ① TRACP-5b は、他の骨吸収マーカーに比べて日内変動、日差変動が少なく、また食事や運動の影響も受けないため、採血条件を気にする必要がありません。
- ② TRACP-5b の検査材料は「血清」です。「尿」を材料とする他の骨代謝マーカーのようにクレアチニン補正の必要がありません。

No.	検査項目	採取容器	検体量 (mL)	所要日数	実施料判断料	検査方法	基準値及び単位	備考
2401	骨型酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ (TRACP-5b)	スピッツ 茶色栓 2mL	血清 0.5	2~4	160 ※4	EIA	男性 170~590 女性 (YAM) 120~420 (mU/dL)	YAM: 若年成人平均値 女性の基準値は、健常閉経前女性 (30~40歳) で確立された平均 ± 1.96 標準偏差の範囲としています。なお、閉経後女性にも適用されます。

※4 生化学的検査 (II) 判断料

Web きゃどらいん一時使用不可について

Web きゃどらいん用のサーバ機更新作業を、以下の時間帯をもって行います。

2 月 22 日 (金) 21:00~翌 2 月 23 日 (土) 7:00 までの間、関連サーバが一時的に停止となり、Web きゃどらいんの閲覧などができませんので、お知らせいたします。詳細は HP をご覧ください。

ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

お問い合わせ先：電算室 (内線 634)