

検査ニュース

No.153

ご挨拶

平素より、佐賀県医師会成人病予防センター業務には、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
今回は主に「検査内容変更」についてご案内します。

佐賀県医師会成人病予防センター
担当理事 志田 正典

● 検査内容変更について

平成 26 年 7 月 4 日 ご依頼分より変更

案内書掲載頁	項目コード No.	検査項目	変更内容	新	現	備考
71	2073	HCV抗原(HCVコア蛋白)	検査方法	CLIA	CLEIA	現試薬発売中止に伴う高感度試薬への変更。
			基準値(単位)	3.0未満 (定量下限値) (fmol/L)	20未満 (定量下限値) (fmol/L)	
86	2597	TSH刺激性レセプター抗体(TSAb)	検査方法	Bioassay EIA	Bioassay RIA	Non-RIA試薬への変更。
			基準値(単位)	120以下 (%)	180以下 (%)	
			所要日数	3~5日	4~6日	
87	2618	副甲状腺ホルモン (Whole PTH)	検査方法	CLEIA	RIA固相法(IRMA)	Non-RIA試薬への変更。
			基準値(単位)	8.3~38.7 (pg/mL)	9~39 (pg/mL)	
			検体量	血漿 0.5mL (EDTA-2Na)	血清 0.5mL	
			所要日数	2~4日	3~5日	
			備考	なし	不活化(非働化)検体は検査値に影響を及ぼす場合がありますので避けてください	
89	1238	L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)	所要日数	3~5日	3~9日	
114	2203	トリメタジオン	検査方法	LC-MS/MS	Gas-Chromatograph法	4月1日より変更しております

● エストロゲン分画(非妊婦尿中値) 基準値の変更(案内書掲載項 91)

【現】 非妊婦尿中値 (単位 $\mu\text{g/day}$)

項目コードNo.	2708	2712	
性別(性周期)	エストラジオール(E2)	エストリオール(E3)	
女性	卵胞期 前期	3.6~11.0	3.0~25.0
	卵胞期 後期	3.5~19.0	3.7~41.0
	排卵期	11.0~29.0	5.6~74.0
	黄体期	7.0~26.0	7.8~57.0
男性	0.2~2.1	1.8~11.0	



【新】 非妊婦尿中値 (単位 $\mu\text{g/day}$)

項目コードNo.	2708	2712	
性別(性周期)	エストラジオール(E2)	エストリオール(E3)	
女性	卵胞期	0.50~5.00	1.00~8.00
	排卵期	2.00~10.0	2.00~20.0
	黄体期	5.00~20.0	5.00~30.0
男性	0.10~3.00	0.30~10.0	

● アミノインデックス検査における注意点の変更

AICS (AminoIndex® Cancer Screening) とは

アミノインデックス®を用いて、がん罹患しているリスクを評価する検査です。

AICSの検査における注意点

- ・検査前8時間以内に、水以外(食事、サプリメント等)は摂らないで、午前中に採血してください。
- ・検査時に妊娠されている方、授乳中の方、がん患者(治療中を含む)の方、先天性代謝異常の方、透析患者の方は、AICS値に影響がありますので検査は受けられません。

