

大腸CT検査を受けられる方へ

				様	来院時間:	時	分
検査日:	月	日	曜日		検査時間:	時	分

●検査前日までは、排便を促すため水分を多めに摂取してください。

検査前日 (/)	朝食	朝食用検査食を召し上がってください。	食後  水分は多めに摂取してください	チェック欄 <input type="checkbox"/>
	昼食	昼食用検査食を召し上がってください。	食後  水分は多めに摂取してください	<input type="checkbox"/>
	夕食	夜7時まで、 夕食用検査食を召し上がってください。	食後  水分は多めに摂取してください	<input type="checkbox"/>
	夜7時	下の腸管洗浄液・造影剤の飲み方を参考に、 腸管洗浄剤を飲用してください。 (頻回の便通があり就寝前までに水様の状態になるのが望ましい)		<input type="checkbox"/>
	夜9時	下剤2錠をコップ1杯以上の水で飲んでください。 以降、夜間は水分(水・お茶)は少量とっても構いません。		<input type="checkbox"/>
当日 (/)	起床後	朝食は絶対におとりにならないでください。 普段服用している薬がある方は 朝6時まで に飲んでください。 朝6時以降は検査まで、絶対に飲んだり食べたりしないでください。 お口を潤す程度の飲水はしていただいて構いません。		<input type="checkbox"/>

腸管洗浄液・造影剤の飲み方 (モビプレップの場合)

検査前日	①表面の指示書通りにモビプレップ溶液を作ります。	②先に500mlを捨てて、1.5Lにします。モビプレップ溶液 1200ml を飲みます。	③モビプレップ溶液が残り 300ml になったら、ガストログラフィン 30ml を加えてよく混ぜ全て飲みます。
			
	モビプレップ 2000ml	モビプレップ溶液1200ml	モビプレップ溶液300ml ガストログラフィン30ml

※腸管洗浄剤はお一人での服用は避けてください。

※次の症状がでた場合は、直ちに服用を止め、紹介医に連絡を取り指示を受けてください。

(吐気、吐く、お腹が痛い、顔が青ざめる、めまい、寒気、じんましん、息苦しい、顔のむくみ)

※糖尿病のお薬をご使用の方は、かかりつけの医師に使用方法をご確認ください。